

MAASIKAISTIKUD MOUNT EVEREST SOOVITUSED ISTUTAMISEKS

Istikute kättesaamisel

Soovitav on istikute mahaistutamiseaeg alustada kohe, istutamise kõige hilisem tähtaeg- 2-3 päeva pärast istikute kättesaamist. Maasikaistikud tarnitakse kohale jahutatud olekus (nad kaevati pinnasest välja vegetatiivse une ajal ning paigutati spetsiaalsesse külmikusse). Kui ronimaasikate istikuid pole võimalik kasvukohale istutada kohe pärast nende soetamist, võib hoida neid külmkapis juurviljade säilitamise riivil.

Külmikus hoidmine tagab taimede edaspidise ärkamise ning nad hakkavad kasvama kohe pärast nende mahaistutamist.

Istikute ettevalmistamine

Enne mahaistutamist asetada istikud veeämbrisse (10-15 minutiks, mitte rohkem).

Istutamine

Istikud tuleb istutada suhteliselt sügavale (vt. joonist). Kui pinnas Teie aias ei ole istutamiseks ettevalmistatud, temperatuur väljas aga ei ulatu üle +5-6 kraadi, siis ärge heitke meelt: istutage istikud lillepottidesse ja pange aknalauale, kus on palju päikesevalgust, ning alles siis, kui saabuvad soojad ilmad, istutage taimed õue peenrasse.

Kastmine

Esimese 10 päeva jooksul pärast mahaistutamist tuleb istikuid kasta iga päev.

Esmakordselt kastetakse istikuid kohe pärast nende mahaistutamist.

Temperatuur

Kõrgem temperatuur kiirendab istikute kasvu. Paremaks juurdumiseks on istutamisel soovitatav tagada temperatuur +14-+15 °C.

Maasikas kasvab ka madalama temperatuuri puhul.

Väetamine

Maasikas ei armasta liiga kõrge soolasusega pinnast (tema juured võivad kahjustuda) valige neutraalse pinnasega paik.

Kolm nädalat pärast istutamist on soovitatav alustada regulaarset väetamist (1-2 g tasakaalustatud väetist liitri vee kohta igal kastmiskorral).

Samuti on soovitatav kasutada aeglaselt lahustuvaid väetisi (mis on arvestatud 3-6 kuuks).

Kaitse kahjurite eest

Kaitsta rooside jahukaste eest (profülaktikaks töödelda väävliga, nimrodiga jne.)

Samuti tuleb kaitsta parasiitseene Botrytis, lehetäide ja ämblike eest

Tolmlemine

Kui Teie aias kasvab ka teisi maasikasorte, siis soovime istutada maasikasordi Mount Everest nendest eemale, et vältida taimede omavahelist risttolmlemist.

Mulla ettevalmistamine

Maasikate kasvukohaks tuleks valida koht, kus ei kasva mitmeaastast umbrohtu, näiteks harilikku orasheina. Sobivaim on kerge, kohev, aga niiske muld. Maasikaid ei tohi istutada sinna, kus enne seda oli kasvatatud tomateid, kartuleid või vaarikaid, samuti maasikaid. Kõige paremini sobib selline kasvupinnas, kus eelmist kultuuri on rohkesti väetatud sõnnikuga, kuna ta imendub mulda aeglaselt ja selles sisalduvad mineraalained vabanevad pikema aja jooksul.

Istutamine

Neli nädalat enne istutamist ja sama palju pärast istutamist ei ole vaja mingit väetist. Istikute mahapanemisel teha istutusauk täpselt nii laiaks ja sügavaks, et juured keerdu ei jääks, need tuleb ilusti sirgelt laiali laotada.

Istikuid ei istutata liiga sügavale, istiku südamik koos uute pungadega peab jääma mullapinnale. Liiga sügaval istutamisel muutuvad taimed hahkhallitusele väga vastuvõtlikuks. Sort MOUNT EVEREST (tõlge prantsuse keelest-Everesti mägi) on võimeline andma pikki võsusid ning hakkab praktiliselt kohe moodustama leherosette, isegi ilma juurdumata, ajama kasvupunkti välja õievarsi, õitsema ja vilju kandma. Selliseid võrseid võib siduda toe külge ja suunata ülespoole, aga samuti võib maasikaid istutada tara või võrkaia äärde.

Esimesed õied tuleks eemaldada, et taim koguks jõudu. Talve lähenedes tuleks eemaldada esimesed viljakandnud võrsed.

Rõdul pottides või kastides kasvatatud ronimaasikad on soovitatav jätta õue ka talveks. Tuleb jälgida, et juurestik ära ei kuivaks. Pinnase kaitsmiseks kuivamise ja umbrohu eest tuleks see katta musta aianduskilega või võrguga. Katteks võib kasutada ka õlgi.

Nelja nädala möödudes pärast maha istutamist tuleks taimed väetada; ronimaasikate puhul saagikuse tõstmiseks tuleks anda väetist kogu vegetatsiooniperioodil.

Haigused

Aedmaasikate ohtlikum haigus on HALLITUS. Selle vältimiseks tuleks taimed pritsida lühikese lagunemisperioodiga (1 päev) seennakkusevastaste preparaatidega.

Kõige sagedamini esinevaks maasikataimede haiguseks on JAHUKASTE. See on pinnase seenhaigus, mis hakkab vohama siis, kui muld pole enne maasikate istutamist õigesti

ette valmistatud. Haigus põhjustab juurte ja võrsete kuivamist. Sel juhul on tähtis haigete taimede hävitamine ja tervete taimede teise kohta ümberistamine.

Värskestistutatud taimi on vaja kaitsta võimalike öökülmade eest (tuleks kattelooriga kinni katta).

[Eestdirect office OÜ ei kannu vastutust halbade ilmastiku olude tõttu tekkinud istikute kahjustuste eest.](#)

Järgides kõiki nõuandeid ronimaasikate istutamise ja haiguste ennetamise kohta, saate kindlasti nautida nende maasikate suurepäraseid saaki.

